

KALIUM CANRENOAAT

(SOLDACTONE®)

Afleveringsvorm

Gelyofiliseerde ampullen met 200 mg kalium canrenoaat voor I.V. gebruik.

Bereiden

Intraveneus : onmiddellijk vóór het gebruik wordt de inhoud van de ampul opgelost in 4 ml gedistilleerd water voor injectie. Het flesje even schudden. Deze oplossing wordt langzaam ingespoten, in minimum 2 à 3 minuten.

Intraveneus als infuus : De zoals hierboven aangemaakte oplossing mag toegevoegd worden aan 250 ml 5% glucose of 250 ml fysiologische NaCl oplossing en wordt vervolgens onmiddellijk via perfusie toegediend.

Toedienen

Intraveneus : Deze oplossing wordt langzaam ingespoten, in minimum 2 à 3 minuten.

Intraveneus als infuus : Duur van de perfusie : ongeveer 30 minuten. Niets belet de volledige dagelijkse dosis toe te dienen in dezelfde perfusie van ongeveer 30 minuten (3 ampullen Soldactone 200 mg).

Infuusvloeistoffen

NaCl 0.9%, glucose 5%

Onverenigbaar met

Bij het mengen met andere producten voor parenteraal gebruik, moet worden gelet op het optreden van opalescentie of neerslagvorming die op een onverenigbaarheid duiden. De meeste antibiotica zijn onverenigbaar. Een nauwkeurige controle van de oplossing is in elk geval vereist.

Acute reacties

Nausea, braken, kortstondige mentale stoornissen en eventueel hyperkaliëmie.

Bijzonderheden

De oplossing moet onmiddellijk vóór het gebruik aangemaakt worden. Bij bewaring wordt de oplossing troebel.