

Prednisolon

(Solu-dacortine)

Afleveringsvorm

Ampul met 25 mg +1 ml solvens (25 mg/ml) , ampul met 50 mg +1ml solvens (50mg/ml) en ampul met 250mg +2ml (125mg/ml) prednisolonnatriumhemisuccinaat

Oplosmiddel

Water voor injecties (bijgeleverd)

Bereiden

los het poeder op met het oplosmiddel.

Toedieningsroute

Volwassenen

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, de toedieningssnelheid is 25 mg/minuut

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50–100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in tenminste 20 minuten

Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%

Intra-/peri-articulair: onverdund

Kinderen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam

Intraveneus als kortlopend infuus: verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 1 mg/ml, in 30 minuten

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4°C of 20°C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site : kaliumchloride

Infuus : aminofylline (ref. 23), benzylpenicilline, heparine, mannitol, prethcamide (ref. 23)

Onverenigbaar met

Calciumzouten

Acute reacties

Roodheid en pijnlijkheid op injectieplaats.

Bijwerkingen

Vochtretentie, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierzwakte.