

Vitaminen (wateroplosbaar)

(Soluvit[®] Novum)

Afleveringsvorm

Gelyofiliseerd poeder van wateroplosbare vitamines in vial van 10 ml voor volwassenen en kinderen.

Bereiden

Het poeder van een flacon Soluvit N kan opgelost worden in:

- 10 ml water voor injectie
- 10 ml glucose 5 à 50%
- 10 ml Intralipid of Structolipid 20%
- 10 ml Vitalipid N Adult/Infant

Toedienen

- Intraveneus als bestanddeel van totale parenterale voeding (TPN)
- Intraveneus als langzaam IV-infuus: minimumtoedieningstijd te respecteren is 3 uur. (Idealiter over 12 à 24 uur).
- Kortlopend IV-infuus of bolusinjectie wordt afgeraden omwille van ontoereikende opname van de vitamines !
- Bij toevoeging van Soluvit N aan een lipidenbevattend mengsel voorkomt men fotodegradatie van de vitamines.

Houdbaarheid

- Na doorverdunnen in infuusvloeistof : 24 uur bij kamertemperatuur.

Infuusvloeistoffen

- Soluvit N kan toegevoegd worden aan glucose 5%-50%, NaCl 0,9%, Intralipid en Structolipid, Aminomix , all-in-one TPN mengsels.

Bijzonderheden

- Soluvit N bevat per flacon: vitamine B1(thiamine) 3,0 mg, Vitamine B2 (riboflavine) 3,6 mg, vitamine B3 (nicotinamide) 40,0 mg, vitamine B6 (pyridoxine) 4,0 mg, vitamine B5 (panthoteenzuur) 15,0 mg, biotine 60,0 µg, foliumzuur 0,4 mg, vitamine B12 (cyanocobalamine) 5,0 µg, vitamine C (ascorbinezuur) 100,0 mg.

Acute reacties

Zelden: overgevoelighedsreacties (ten gevolge van thiamine)