

SUFENTANIL

(SUFENTA[®], SUFENTA FORTE[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 10 microg = 2 ml (5 microg/ml) sufentanil (als citraat) (SUFENTA[®]) en
50 microg / 10 ml

Ampul met 250 microg = 5 ml (50 microg/ml) sufentanil (als citraat) (SUFENTA FORTE[®])

Toedienen

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund of toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% in tenminste 2 minuten
- Intraveneus met behulp van spuitpomp
- Epiduraal: onverdund of toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% tot een eindvolume van 10 ml
- Epiduraal als infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%

Code voor toedienen

Categorie A en D

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C.

Na optrekken in medicatiecassette: 48 uur bij 32 °C.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Bupivacaine

Bijzonderheden

- Sufentanil wordt voor langdurig epiduraal gebruik in een medicatiecassette toegepast.
- Sufentanil valt onder de bepalingen van de wetgeving voor verdovende middelen.

Acute reacties

Allergische reacties

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie, bradycardie, bronchospasmen, spierrigiditeit, misselijkheid.
Na epidurale toediening tevens braken, pruritus, bloeddrukschommelingen,
hypothermie, urineretentie, hoofdpijn.

Bereiden

Voeg 2 ampullen 250 microg = 5 ml sufentanil toe aan 40 ml NaCl 0,9% of glucose 5%;
de eindconcentratie is 10 microg/ml, 50 ml

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Toedienen via perfusor

Gebruikelijke dosering: 0,7-3 microg/kg/uur

| SPUITENPOMP eindconcentratie is 10 microg/ml | | |
|---|------------|---------------|
| ml/uur | microg/uur | microg/24 uur |
| 3,0 | 30 | 720 |
| 6,0 | 60 | 1440 |
| 9,0 | 90 | 2160 |
| 12,0 | 120 | 2880 |
| 15,0 | 150 | 3600 |
| 18,0 | 180 | 4320 |
| 21,0 | 210 | 5040 |
| 24,0 | 240 | 5760 |
| 27,0 | 270 | 6480 |
| 30,0 | 300 | 7200 |