

TETRACOSACTIDE

(SYNACTHEN[®], SYNACTHEN DEPOT[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 250 microg = 1 ml (250 microg/ml) tetracosactide (als hexa-acetaat)
Ampul met 1 mg = 1 ml (1 mg/ml) tetracosactide (als hexa-acetaatzink) "Depot"
(alleen voor intramusculaire toediening)

Toedienen

- Intramusculair: 250 microg/ml of 1 mg/ml "Depot"
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, 250 microg/ml in 2 minuten
- Intraveneus als infuus: 250 microg/ml, toegevoegd aan 50-250 ml NaCl 0,9% of glucose 5% in maximaal 4 uur

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 4 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Bijzonderheden

Tetracosactide "Depot" bevat benzylalcohol.

Acute reacties

Roodheid en pijnlijkheid op injectieplaats, urticaria, pruritus, flush, dyspnoe, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Natrium- en waterretentie, hypertensie, hypokaliëmie, hyperglycemie, psychische veranderingen, ulcus pepticum, hyperpigmentatie