

FLECANAÏDE

(TAMBOCOR®)

Afleveringsvorm

Ampul met 150 mg = 15 ml (10 mg/ml) flecaïnide-acetaat

Toedienen

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, 2 mg/kg, de toedieningssnelheid is max. 150 mg/10 min.
- Intraveneus met behulp van spuitpomp

Code voor toedienen

Categorie A en D

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%

Verenigbaar met

Kaliumchloride

Onverenigbaar met

Natriumchloride, Ringerlactaat

Bijzonderheden

Flecaïnide moet onder bewaking van hemodynamische parameters en het ECG worden toegediend

Acute reacties

Flushing

Bijwerkingen

Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, visusstoornissen, dyspnoe, vermoeidheid, tremor, nervositeit, aritmieën, angina pectoris.

Bereiden

Voeg 2 ampullen 150 mg = 15 ml flecaïnide toe aan 20 ml glucose 5%; eindconc. is 6 mg/ml, 50 ml

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Toedienen via perfusor

Gebruikelijke doseringen: aanvankelijk: 2 mg/kg, maximaal 150 mg/10 minuten
onderhoud: 0,125 - 0,25 mg/kg/uur, max. 600 mg/24 uur.

| SPUITENPOMP eindconcentratie is 6 mg/ml | | |
|--|--------|-----------|
| ml/uur | mg/uur | mg/24 uur |
| 0,5 | 3 | 72 |
| 1,0 | 6 | 144 |
| 1,5 | 9 | 216 |
| 2,0 | 12 | 288 |
| 2,5 | 15 | 360 |
| 3,0 | 18 | 432 |
| 3,5 | 21 | 504 |
| 4,0 | 24 | 576 |