

OFLOXACINE

(TARIVID[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 200 mg = 100 ml (2 mg/ml) ofloxacin (als hydrochloride)

Flacon met 400 mg = 200ml (2mg/ml) ofloxacin (als hydrochloride)

Toedienen

Intraveneus als kortlopend infuus: onverdund, 200mg in 30 min

Houdbaarheid

Na aanpakken: 24 uur bij 20 °C, buiten de invloed van licht bewaren.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Amoxicilline, ampicilline, cefotaxim, ceftazidim, clindamycine, gentamicine, mannitol, natriumbicarbonaat, piperacilline, tobramycine, vancomycine

Onverenigbaar met

Y-site: calciumzouten, magnesiumzouten, sporenelementenoplossingen

Infuus: flucloxacilline

Bijzonderheden

Kan zo nodig verdund worden met infuusvloeistof

Ofloxacin is gecontraïndiceerd bij kinderen jonger dan 16 jaar wegens de kans op afwijkingen in het gewrichtskraakbeen

Acute reacties

Rash, eczeem, jeuk, oedeem, fotosensibiliteit, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, arthralgie, voorbijgaande leverfunctie- en bloedbeeldafwijkingen, tachycardie, hypotensie. Maagdarmstoornissen als: maagpijn, buikpijn, anorexie, misselijkheid, braken, diarree, pseudomembraneuze colitis. Centrale bijwerkingen als: hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid, sufheid, transpireren, paresthesieën, perifere neuropathie, visusstoornissen, verwardheid, convulsies, onrust, paniekreacties, hallucinaties, reuk-, kleur- en smaakstoornissen