

Levofloxacin

(Tavanic[®] 500 I.V.)

Afleveringsvorm

Heldere groen -gele oplossing voor infusie van 5 mg/ml (500 mg/100 ml).

Bereiden

Levofloxacin bevindt zich onder opgeloste vorm in flacon van 100 ml die als dusdanig wordt toegediend.

Toedienen

Het moet als trage Intraveneuze infusie worden toegediend over minstens 60 min

Houdbaarheid

- Wanneer de buitenverpakking wordt verwijderd is het nog 3 dagen houdbaar (buiten invloed van sterk licht)
- Na aanpakken van de flacon moet het geneesmiddel binnen de drie uur gebruikt worden

Onverenigbaarheden

Levofloxacin is onverenigbaar met: antidiabetica, antiarytmica, cimetidine, cyclosporine, febuphen en andere niet steriodale antiflogistica phenothiazine, probenecid, vitamine K antagonisten en theofylline

Interactie

Geef gescheiden van voeding en sondevoeding: 1 uur voor en 1 uur na de inname stoppen met elke vorm van voeding.

Acute reacties

- Tachycardie en tijdelijke daling van de bloeddruk kunnen voorkomen. Zelden evolueert deze tot collaps. Bij te snelle bloeddrukdaling moet het infuus gestopt worden.
- De meest voorkomende bijwerkingen zijn: diarree, misselijkheid, jeuk, huiduitslag en roodheid ter hoogte van de insteekplaats

Bijzonderheden

Wegens onvoldoende gegevens bij de mens en risico op aantasting van gewrichtskraakbeen tijdens groeiperiodes mag Tavanic[®] niet gebruikt worden bij kinderen, tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Bron

Compendium 2004