

CLEMASTINE

(TAVEGYL®)

Afleveringsvorm

Ampul met 2 mg = 2 ml (1 mg/ml) clemastine (als waterstoffumaraat)

Toedienen

Intra-arteriële injectie moet in alle gevallen worden vermeden

Intramusculair: onverdund

**Intraveneus als bolusinjectie: onverdund ZEER LANGZAAM (2-3 minuten per ampul),
Intraveneus als infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%, in een verhouding
1:5 (bijsluiter 13/02/2009), bij voorkeur toch 100 ml gebruiken (= info firma, dec 2009
NB)**

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Bijzonderheden

Intra-arteriële toediening moet worden voorkomen.

Acute reacties

Zelden: dyspnoe, anafylactische shock

Bijwerkingen

Vermoeidheid, slaperigheid. Zelden: misselijkheid, huiduitslag, droge mond, accommodatie- en mictiestoornissen, hartkloppingen, diarree, obstipatie, transpireren, hoofdpijn. Met name bij kinderen: paradoxale reacties,