

PIPERACILLINE met TAZOBACTAM

(TAZOCIN®)

Afleveringsvorm

injectieflacon IV infusie met 4 g piperacilline en 500 mg tazobactam (als natriumzouten)
gelyofiliseerd poeder

Bereiden

de inhoud van de flacon van 4 g/500mg Tazozin dient opgelost te worden met 20ml aqua voor voor inj., NaCl 0.9% of gluc 5%.

De gereconstitueerde oplossing kan verder verdund worden tot 50ml of 100ml met een van bovenvermelde oplosmiddelen

Toedienen

trage intraveneuze injectie (ABG richtlijnen hieronder)

o oplaaddosis: 4 G over 30 minuten (in minstens 100 ML NaCl 0,9% of glucose 5%)

o onderhoudsdosis: 4 G over 3 uur (in minstens 100 ML NaCl 0,9% of glucose 5%) om de 6 uur

Vb.

DAG 1 1) 00u00: oplaaddosis piperacilline/tazobactam 4G/100 ML NaCl 0,9% over 30 min

DAG 1 2) 00u30: onderhoudsdosis piperacilline/tazobactam 4 G/100 ML NaCl 0,9% over 3 u

DAG 1 3) 06u30: onderhoudsdosis piperacilline/tazobactam 4 G/100 ML NaCl 0,9% over 3 u

DAG 1 4) 12u30: onderhoudsdosis piperacilline/tazobactam 4 G/100 ML NaCl 0,9% over 3 u

DAG 1 5) 18u30: onderhoudsdosis piperacilline/tazobactam 4 G/100 ML NaCl 0,9% over 3 u

DAG 2 6) 00u30: onderhoudsdosis piperacilline/tazobactam 4 G/100 ML NaCl 0,9% over 3 u

.....

Dosisreductie kan aangewezen zijn bij nierinsufficiëntie. Op intensieve zorgen mag de oplaaddosis in 50 ml maar wordt het ganse toedieningsschema in een spuitpomp gegeven. De 100 ml als oplosmiddel wordt aangeraden om verlies via de leiding bij de volumetrische pomp te reduceren.

Code voor toedienen

categorie A en B

Houdbaarheid

de oplossingen zijn stabiel gedurende 24 uur bij kamertemperatuur en gedurende 48 uur in de koelkast (2° tot 8°C)

Onverenigbaar met

Tazozin mag niet met andere stoffen gemengd worden in eenzelfde spuit of infusiefles.

Gelijktijdige behandeling met een ander antibioticum vereist afzonderlijke toediening. **DE FIRMA MELDT SINDS 01/02/2008 EEN NIEUWE BUFFERSAMENSTELLING WAARDOOR Y-SITE VERENIGBAARHEID MET RINGERLACTAAT, AMIKACINE (AMUKIN) EN GENTAMYCINE (GEOMYCINE) BESCHREVEN IS**

Bijzonderheden

Tazozin bevat 54mg (2.3mEq) natrium per 1g/125mg piperacilline/tazobactam