

## TAZOCIN® 4 g/500 mg

<b>Stofnaam</b>	Piperacilline (natrium) + tazobactam (natrium)
<b>Klasse</b>	Infecties – antibacteriële middelen – beta-lactamantibiotica - penicillines – acylureïdopenicillines
<b>Farmaceutische vorm</b>	Poeder voor oplossing voor infusie

### Bereiden

#### Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 20 ml NaCl 0,9% OF 20 ml water voor injectie OF 20 ml glucose 5%

#### Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NaCl 0,9% OF water voor injectie OF glucose 5% tot gewenst volume (bv: 50 ml tot 150 ml)

### Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 30 minuten

### Houdbaarheid/Bewaarcondities

<b>Product</b>	beneden 25°C
<b>Na oplossen</b>	24 uur bij 25°C OF 12 uur bij 2 – 8°C
<b>Na verdunnen</b>	24 uur bij 25°C OF 24 uur bij 2 – 8°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

### Verenigbare infusen

**Onverenigbare infusen** Ringerlactaat, Hartmann, natriumbicarbonaat



Vlaamse Vereniging van  
Ziekenhuisapothekers

CNK: 1063577  
ATC: J01CR05

### **Bijzonderheden**

- Hypersensitiviteit, hypotensie, tromboflebitis
- pH = 5.7
- Beta-lactam antibiotica inactiveren aminoglycosiden.

### **Bronnen**

1. SKP Tazocin® (07/2015)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Injectable Drugs Guide (2011)
4. Handbook on Injectable Drugs (online, 23/08/2015)

(23/08/2015)

---

#### **DISCLAIMER**

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.