

BUPRENORFINE

(TEMGESIC[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 300 microg = 1 ml (300 microg/ml) buprenorfine (als hydrochloride)

Toedienen

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in minimaal 2 minuten

Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% tot een concentratie van 15 microg/ml

Epiduraal: onverdund

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 8 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: allopurinol, filgastrim, piperacilline

Infuus: atropine, droperidol, haloperidol, midazolam, promethazine, scopolamine

Onverenigbaar met

Y-site: diazepam, heparine, lorazepam

Infuus: furosemide

Bijzonderheden

Buprenorfine valt onder de bepalingen van de Opiumwet.

Bijwerkingen

Slaperigheid, apathie, duizeligheid, misselijkheid, braken, hoofdpijn, transpireren, droge mond, hypotensie, bradycardie, ademhalingsdepressie.

Zelden: euforie, verwardheid