

# ATENOLOL

(TENORMIN®)

## Afleveringsvorm

Ampul met 5 mg = 10 ml (0,5 mg/ml) atenolol in een waterige natriumcitraat bufferoplossing

## Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund of toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%, de toedieningssnelheid is 1 mg/minuut.

## Code voor toedienen

Categorie A

## Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C, buiten invloed van licht.

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

## Verenigbaar met

Y-site: morfine, pethidine

## Bijzonderheden

Atenolol moet onder bewaking van hemodynamische parameters worden toegediend.

De werking van atenolol kan vertraagd intreden (soms na 10 minuten of later), zodat de toediening langzaam en met tussenpozen dient te geschieden.

## Acute reacties

Exantheem. Ten gevolge van te snelle toediening: hypotensie en shock.

## Bijwerkingen

Orthostatische hypotensie, bradycardie, decompensatio cordis, verstopte neus, dromen, hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid, diarree, vermoeidheid, droge mond, mictieklachten, visustoorningen, huidreacties, lusteloosheid, krampaanvallen, koude extremiteiten.