

# TICARCILLINE / CLAVULAANZUUR

(TIMENTIN<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Flacon met 3000/200 mg ticarcilline (als natriumzout)/clavulaanzuur (als kaliumzout) poeder voor injectievloeistof.

Flacon met 5000/200 mg ticarcilline (als natriumzout)/clavulaanzuur (als kaliumzout) poeder voor injectievloeistof.

## Oplosmiddel

Water voor injecties

## Bereiden

Los 3000/200 mg ticarcilline/clavulaanzuur op in minimaal 60 ml water voor injecties. De concentratie is maximaal 50/3,3 mg/ml.

## Toedienen

Intraveneus als kortlopend infuus: onverdund of toegevoegd aan NaCl 0,9% in 20-30 minuten

## Code voor toedienen

Categorie B

## Houdbaarheid

Onverdund en na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat, water voor injecties

## Verenigbaar met

Fluconazol, insuline, morfine, pethidine, ondansetron

## **Onverenigbaar met**

Aminoglycosiden, natriumbicarbonaat

## **Bijzonderheden**

Bevat 5,2 mmol natrium en 0,28 mmol kalium per 1000 mg ticarcilline.

## **Acute reacties**

Exantheem, urticaria, purpura

## **Bijwerkingen**

Tromboflebitis, misselijkheid, braken, diarree, onaangename smaak, buikkrampen, hepatotoxiciteit. Ten gevolge van hoge doseringen: bloedbeeldafwijkingen, stollingsafwijkingen, neurotoxiciteit