

Tramadolhydrochloride

(Tradonal[®] amp IM-IV-Inf)

Afleveringsvorm

Oplossing van 50 mg/ml (100 mg/2 ml).
voor intramusculaire en intraveneuze toediening of toediening via intraveneus infuus.

Bereiden

Tramadolhydrochloride bevindt zich onder opgeloste vorm in een ampul van 2 ml die als dusdanig kan worden toegediend.

Toedienen

Intraveneus dient 1 ampul gegeven te worden over een tijdspanne van minstens 2 minuten.

Als infuus: toedienen met onderstaande infuusvloeistoffen. De minimale periode waarover Tradonal mag toegediend worden is 2 minuten. Als infuus dient het in functie van de pijn toegediend te worden dit betekent zo traag mogelijk. De bovengrens voor het toedienen is een tijdspanne van 24 uur, daarna is het product niet meer stabiel.

Infuusvloeistoffen

Natriumchlorideoplossing 0.9%, glucose oplossing 5 of 10%. Tradonal[®] vertoont enkele fysische onverenigbaarheden met andere geneesmiddelen (zie onder onverenigbaarheden).

Houdbaarheid

Bewaren beneden 25 °C. Wanneer een ampul wordt geopend dient zij meteen gebruikt te worden.

Onverenigbaarheden

- Het is incompatibel met infuusoplossingen die diclofenac, indomethacine, fenybutazon, diazepam, flunitrazepam, midazolam en glyceryltrinitraat bevatten.
- Bij parenterale toediening kunnen er fysische incompatibiliteiten voorkomen met o.a. NSAID's, en anionische producten.

Acute reacties

Misselijkheid, duizeligheid en braken wordt gezien bij meer dan 10 % van de patiënten. Verder ook hoofdpijn, slaperigheid, verwarring, sufheid, constipatie, droge mond en transpiratie.

Bijzonderheden

- Het gebruik wordt afgeraden tijdens zwangerschap (zeker in het laatste trimester) en de borstvoedingsperiode.
- Langdurig gebruik kan leiden tot afhankelijkheid.
- Vermijd alcohol en geneesmiddelen met een centrale activiteit (paroxetine, sertraline, fluoxetine), meperidine, MAO-inhibitoren, naltrexon, buprenorfine, nalbufine, pentazocine, coumarine derivaten, cimetidine, carbamazepine, ritonavir, quinidine.

Bron

Compendium 2004