

# CLORAZEPINEZUUR

(TRANXENE<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Flacon met 20 mg, 50 mg en 100 mg dikaliumclorazepaat poeder voor injectievloeistof

## Oplosmiddel

Fosfaatbuffer (bijgeleverd)

## Bereiden

Los 20 mg, 50 mg clorazepinezuur op in 2 ml, 2,5 ml oplosmiddel. De concentratie is 10 mg/ml resp. 20 mg/ml

## Toedienen

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam

Intraveneus als infuus: toegevoegd aan 250-500 ml NaCl 0,9% of glucose 5%

## Code voor toedienen

Categorie A en B

## Houdbaarheid

Direct na bereiden toedienen

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

## Bijzonderheden

Clorazepinezuur mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend.

Bevat mannitol en kaliumcarbonaat.

Clorazepinezuur wordt vooral toegepast bij alcoholabusus.

## Acute reacties

Ten gevolge van i.v. toediening: pijnlijke op injectieplaats, hypotensie, ademshalingsdepressie

## **Bijwerkingen**

Sufheid, slaperigheid, spierzwakte, coördinatiestoornissen, anorexie, hoofdpijn, duizeligheid, dubbelzien, anterograde amnesie. Met name bij kinderen en ouderen: paradoxale reacties als acute opwinding, psychische veranderingen