

# MERCAPTO-ETHAANSULFONZUURNATRIUM

(UROMITEXAN<sup>®</sup>, MESNA)

## Afleveringsvorm

Ampul met 200 = 2 ml en 400 mg = 4 ml (100 mg/ml) mercapto-ethaansulfonzuurnatrium

## Toedienen

### volwassen:

Intraveneus als injectie: onverdund, langzaam

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan glucose 5% of NaCl 0,9% tot een concentratie van 20 mg/ml, in 15-30 minuten

Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan glucose 5% of NaCl 0,9%

### kind:

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam

Intraveneus als kortlopend infuus: verdund met glucose 5% of NaCl 0,9% tot een concentratie van 20 mg/ml, in 30 minuten

Intraveneus als langlopend infuus: aangevuld met glucose 5% of NaCl 0,9% tot 48 ml, in 24 uur.

## Code voor toedienen

Categorie A en B

## Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

## Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, NaCl 0,9%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

## Verenigbaar met

Y-site: allopurinol, filgastrim, fludarabine, melfalan, ondansetron, piperacilline

Infuus: cyclofosfamide, ifosfamide

### Onverenigbaar met

Infuus: carboplatine, cisplatine

## Bijzonderheden

Bevat 0,6 mmol natrium per ml.

## Acute reacties

Zelden: urticaria, jeuk, oedeem, hypotensie, anafylactische shock.

## **Bijwerkingen**

Ulceraties en blaren in slijmvliezen, koorts, tachycardie, maagdarmsstoornissen, hoofdpijn, moeheid, leukopenie, gewrichtspijn