

# DIAZEPAM

(VALIUM®)

## Afleveringsvorm

Ampul met 10 mg = 2 ml (5 mg/ml) diazepam

## Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, de toedieningssnelheid is maximaal 5 mg/ minuut.  
Intraveneus als kortlopend infuus: maximaal 10 mg per 100 ml NaCl 0,9% of glucose 5% om neerslag te voorkomen.

Intramusculair: onverdund

**Intrarectaal (rectiole)**

## Code voor toedienen

Categorie A en B

## Houdbaarheid

Onverdund in spuit: 24 uur bij 20 °C.

Na toevoeging aan infuusvloeistoffen: direct toedienen.

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

## Bijzonderheden

Diazepam mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend.

Oplosbaarheid van diazepam in infuusvloeistof is maximaal 100 mg/l. Diazepam vlokt uit na toevoeging aan infuusvloeistoffen bij een concentratie hoger dan 100 mg/l.

Bevat benzylalcohol.

Diazepam adsorbeert in wisselende mate aan het oppervlak van spuiten (glas en plastics), infuuslangen en filters.

De kans op tromboflebitis wordt verminderd door diazepam toe te dienen in een grote vene, met een toedieningssnelheid niet groter dan 5 mg per minuut.

Intramusculaire toediening slechts indien intraveneuze injectie niet mogelijk is; diazepam i.m. is pijnlijk en bewerkstelligt een onbetrouwbare en wisselende absorptie.

## Acute reacties

Apnoe

## Bijwerkingen

Tromboflebitis, hypotensie, bradycardie.