

Panitumumab

(Vectibix[®])

Afleveringsvorm

20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.

Vectibix[®] is een kleurloze oplossing die mogelijk zichtbare deeltjes bevat en bestaat in flacons van 5 en 20 ml.

Bereiden

Voorafgaand aan infusie dient Vectibix[®] in 0,9% NaCl injectie te worden verdund. Verdund in een totaal volume van 100 ml. Doseringen hoger dan 1000 mg worden verdund in 150 ml. De eindconcentratie mag de 10 mg/ml niet overschrijden. De bekomen oplossing mengen door voorzichtig om te keren, niet schudden.

Toedienen

Vectibix[®] moet als IV infusie via een infuuspomp (met een laag eiwitbindende 0,2 of 0,22 µm in-line filter), via een perifere lijn of verblijfskatheter worden toegediend. De aanbevolen infusietijd is ongeveer 60 min. Doseringen hoger dan 1000 mg hebben een infusietijd van ongeveer 90 min (niet toedienen als een IV push of bolus). Spoel de infusielijn vóór en na toediening met een NaCl-oplossing om vermenging met andere geneesmiddelen of IV-oplossingen te vermijden.

Houdbaarheid

Bewaar in de koelkast (2-8°C), niet invriezen.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking en scherm af van licht (kartonnen doosje). De verdunde oplossing is gedurende 24u stabiel bij kamertemperatuur.

Onverenigbaarheden

Er wordt aangeraden de infusielijn vóór en na toediening te spoelen met NaCl-oplossing om vermenging met andere geneesmiddelen of IV-oplossingen te vermijden.

Ongewenste effecten

Zeer vaak (>1/10)

- huidreacties
- infectie van het nagelbed
- diarree
- extreme vermoeidheid

Vaak (>1/100, <10/100)

- hoesten, dyspnoe
- misselijkheid, braken
- verlies van nagels
- stomatitis en oogontsteking
- hoofdpijn
- extreme haargroei of haarverlies
- uitdroging
- hypomagnesiëmie, hypocalciëmie, hypokaliëmie

Bijzonderheden

- Bij gebruik van panitumumab wordt blootstelling aan zonlicht best vermeden.
- Dit geneesmiddel bevat 0,15 mmol (=3,45 mg) natrium per ml concentraat.

(Bron: wetenschappelijke bijsluiter, 8/08/2008)