

# IJZERSACCHARAAT

## (VENOFER®)

### Afleveringsvorm

ampul met 5ml=100mg injectievloeistof (20 mg/ml)

### Toedienen

intraveneus als injectie: traag 5 min per amp

**(na de injectie de arm van de patient strekken en opheffen en een druk uitvoeren op de injectieplaats voor minimum 5 minuten)**

Alvorens Veno-fer te injecteren eerst een **testdosis** toedienen:

1 ml (onverdund) in 1-2 min, indien na 15 min geen bijwerkingen optreden, dan de IV.injectie traag verder geven (1 ml per minuut of nog 5 min per amp).

Maximum 200 mg per inspuiting

intraveneus als druppelinfuus:

**1 amp oplossen in MAXIMAAL 100 ml NaCl 0.9% = 1 mg/ml.**

**Nooit met meer volume verdunnen want dit is NIET stabiel.**

**De eerste 25 mg (= 25 ml van een infuus van 1 mg/ml) dient traag over 15 minuten gegeven te worden. (zie onder bij bijzonderheden). Indien na 15 min geen bijwerkingen, dan infuus verder geven.**

**LET WEL: bij infuustoediening mag de dosis niet hoger zijn dan 50 mg per 15 minuten.**

### Bijzonderheden

Opgepast voor extravasatie bij IV injectie: ontsteking, pijn en bruine verkleuring van de huid.

Orale therapie starten 5 dagen na de laatste injectie

Niet samen met orale preparaten toedienen.

**Aangepast 09/01/2009 bijsluiter**