

# SALBUTAMOL

(VENTOLIN®)

## Afleveringsvorm

Ampul met 500 microg = 1 ml (500 microg/ml) en 5 mg = 5 ml (1 mg/ml) salbutamol (als sulfaat)

## Toedienen

- Subcutaan: onverdund
- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam
- Intraveneus met behulp van spuitpomp

## Code voor toedienen

Categorie A en D

## Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

## Bijzonderheden

Salbutamol dient onder bewaking van hemodynamische parameters, het ECG en serumkaliumconcentraties te worden toegediend.

## Acute reacties

Zelden: urticaria, angio-oedeem, bronchospasmen, hypotensie, collaps; bij kinderen hyperactiviteit, hallucinaties.

## Bijwerkingen

Na intramusculaire toediening: pijnlijke injectieplaats. Tachycardie, hartkloppingen, tremor, nervositeit. Zelden: misselijkheid, braken, toename van de eetlust, hoofdpijn,

spierkramp, bloeddrukschommelingen, transpireren, verwijde pupillen, slapeloosheid, hyperglycemie, hypokaliëmie.

### Bereiden

Voeg 1 ampul 5 mg = 5 ml salbutamol toe aan 45 ml NaCl 0,9% of glucose 5%; de eindconcentratie is 100 microg/ml, 50 ml

### Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

### Toedienen via perfusor

Gebruikelijke dosering: 2-20 microg/ minuut

SPUITENPOMP eindconcentratie is 100 microg/minuut		
ml/uur	microg/minuut	microg/uur
1,0	1,7	100
2,0	3,3	200
3,0	5	300
4,0	6,7	400
5,0	8,3	500
6,0	10	600
7,0	11,7	700
8,0	13,3	800
9,0	15	900
10,0	16,7	1000
11,0	18,3	1100
12,0	20	1200