

# RIBAVIRINE

## (VIRAZOLE®)

### **Afleveringsvorm**

flacon met 6g steriel gelyophiliseerd poeder voor toediening met aerosol

### **Oplosmiddel**

water voor injecties

### **Bereiden**

los het lyophilisaat op door aseptische toevoeging van 100ml water voor injecties. breng deze oplossing over in het vooraf gesteriliseerde erlenmeyerkolf van 500ml ( SPAG-2 reservoir ) en verdun met water voor injectie tot 300ml ( eindconcentratie 20mg/ml)

### **Toedienen**

-RSV-infectie: ribavirine aerosol ( 20mg/ml) continu toedienen 12-18u/dag gedurende tenminste 3 en maximum 7 dagen met Viratek Model SPAG-2.

Geen andere geneesmiddelen gelijktijdig in aerosolvorm toedienen.

Influenza-infectie: ribavirine aerosol ( 20mg/ml) toedienen gedurende 12-15u/dag in 3 perioden van 4-6 uur gedurende 3 dagen

### **Houdbaarheid**

de oplossing in water voor injectie is 24 u houdbaar bij kamertemperatuur

### **Onverenigbaar met**

interacties met andere geneesmiddelen zijn niet onderzocht.

### **Bijzonderheden**

voor de oplossing van het lyofilisaat geen water aanwenden dat conserveringsmiddelen of andere additieven bevat.

voor de toediening de oplossing visueel onderzoeken op verkleuring en afwezigheid van deeltjes.

de nog aanwezige restvloeistof in het reservoir verwijderen vooraleer de verse oplossing wordt toegevoegd

nooit gelijktijdig andere geneesmiddelen onder aerosolvorm toedienen