

ASCORBINEZUUR

(VITAMINE C, ACIDUM ASCORBICUM)

Afleveringsvorm

Ampul met 1g = 5 ml (200 mg/ml) ascorbinezuur

Toedienen

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 3-5 minuten

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 100-500 ml NaCl 0,9% of glucose 5%

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking.

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C, buiten invloed van licht

Infuusvloeistoffen

Glucose 5% en 10%, Ringerlactaat, NaCl 0,9%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Calciumzouten, cefalotine, chloorpromazine, heparine, kaliumchloride, kanamycine, metoclopramide, prednisolon, procaine, promethazine, vitamine B complex, verapamil

Onverenigbaar met

Y-site: thiopental

Infuus: benzylpenicilline, cefazoline, chlooramfenicol, doxapram, erythromycine, hydrocortison, natriumbicarbonaat, theofylline

Bijzonderheden

Bevat benzylalcohol en natriumpyrosulfiet.

Bij hoge doses kan de bepaling van glucose in de urine gestoord zijn.

Acute reacties

Ten gevolge van te snelle toediening: duizeligheid.

Bijwerkingen

Ten gevolge van hoge doseringen: misselijkheid, braken