

LIDOCAINE-ADRENALINE,

(XYLOCAINE-ADRENALINE[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 100 mg/20 ml (5 mg/ml, 0,5%) lidocaine-HCl + adrenaline 1:100.000 (10 µg/ml)

Flacon met 200 mg/20 ml (10 mg/ml, 1,0%) lidocaine- HCl + adrenaline 1:100.000 (10 µg/ml)

Flacon met 400 mg /20 ml (20 mg/ml, 2,0%) lidocaine- HCl + adrenaline 1:80.000 (12,5 µg/ml)

Toedienen

Lokaal: voor infiltratie- en geleidingsanaesthesie

Intraveneus: voor intraveneuze regionale anaesthesie

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Na aanprikken van flacon: 24 uur bij 20 °C

Bijzonderheden

Intravasculaire toediening kan hypotensie, myocarddepressie en convulsies veroorzaken.

Bevat natriumbisulfiet als anti-oxidans; bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel.

Toevoeging van adrenaline aan de injectievloeistof verlengt de duur van de anaesthesie.

Acute reacties

Overgevoeligheidsreacties: bronchospasmen, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Sufheid, paresthesie, duizeligheid, slaperigheid. Ten gevolge van overdosering: duizeligheid, sufheid, agitatie, wazig zien, koud zweet, spraakstoornissen, tremoren, convulsies, ademdepressie, hypotensie, ritmestoornissen, cardiovasculaire collaps