

ONDANSETRON

(ZOFRAN[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 4 mg = 2 ml en 8 mg = 4 ml (2 mg/ml) ondansetron (als hydrochloride)

Toedienen

volwassen:

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 3-5 minuten
- Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in 15 minuten

kind:

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 3-5 minuten
- Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 0,3 mg/ml, in 30 minuten

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: amikacine, aztreonam, bleomycine, carboplatin, carmustine, cefazoline, cefotaxim, ceftazidim, ceftizoxim, cefuroxim, chlopropromazine, cimetidine, cisplatin, clindamycine, cyclofosfamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, dexamethason, doxorubicine, doxycycline, droperidol, etoposide, famotidine, filgastrim, fluconazol, fludarabine, gentamicine, haloperidol, heparine, hydrocortison, ifosfamide, imipenem, kaliumchloride, magnesiumsulfaat, mannitol, melfalan, mercapto-ethaansulfonzuur, methotrexaat, metoclopramide, mitomycine, mitoxantrone, morfine, paclitaxel, piperacilline/tazobactam, promethazine, ranitidine, teniposide, ticarcilline, vancomycine, vinblastine, vincristine, zidovudine

Onverenigbaar met

Aciclovir, allopurinol, amfotericine B, ampicilline, fluorouracil, furosemide, ganciclovir, lorazepam, methylprednisolon, natriumbicarbonaat, piperacilline, theofylline

Bijzonderheden

Ondansetron mag niet in dezelfde spuit of infuuszak worden gemengd met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen.

Acute reacties

Zelden: overgevoelighedsreacties

Bijwerkingen

Hoofdpijn, opvliegingen, warmtegevoel in perineum, obstipatie, buikpijn, diarree, tromboflebitis. Ten gevolge van te snelle toediening: visusstoornissen