



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

WERKGROEP HOST - OPAT
CONTACT host@vza.be
VERSIE December 2023
OPAT FICHE

OPAT INFORMATIEFICHE VERPLEEGKUNDIGE: Amfotericine B lipidencomplex (Abelcet®) (intermittente intraveneuze infusie)

ALGEMENE INFO

Amfotericine B lipidencomplex is een antimycoticum dat wordt gebruikt in de behandeling van schimmel infecties. Hieronder vindt u de aanbevelingen rond de bereiding en toediening van dit antibioticum in de thuissetting (OPAT = Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy).

Abelcet® is een kant-en-klare oplossing voor infusie. Het geneesmiddel is beschikbaar in volgende dosis:

Beschikbare dosis	Oplosmiddel	Benodigd aantal flacons
Amfotericine B 100 mg/20 ml (=Abelcet®)	kant-en-klare oplossing	<input type="checkbox"/> flacon(s) per toediening

Vergewis u van de juiste dosis per flacon en het juiste aantal flacons nodig per toediening.

Neem naast het aantal nodige flacons ook overige onderstaande materialen ter voorbereiding van de bereiding en toediening:

- 1 infuus Glucose 5% 500 ml
- 1 infuusleiding
- Spuit
- Naalden
- Indien beschikbaar: 1 transfernaald
- Spuit + NaCl 0,9% (voor spoelen)
- Steriele gaaskompressen
- Ontsmettingsmiddel: chloorhexidine in alcohol 70%
- Handalcohol
- Naaldcontainer
- Indien beschikbaar: steriel werkveld

VOORBEREIDING

- **Handhygiëne:**
 - Ontsmet de handen gedurende 15 seconden met handalcohol.
 - Bij zichtbare bevuilding: wassen met water en zeep vooraleer te ontsmetten met handalcohol!
- Zorg voor een zuiver werkvlak: ontsmet het werkvlak gedurende 15 seconden of gebruik een steriel veld.
- Verzamel het nodige materiaal.

BEREIDING

- Controleer de medicatie: naam, hoeveelheid, dosis, vervaldatum en uitzicht (verkleuring, uitvloeking, vaste deeltjes).
- Verwijder zo nodig het beschermkapje van het aanprikpunt van de flacon. Ontsmet het aanprikpunt van de flacon wrijvend gedurende 15 seconden. Wacht vervolgens tot de ontsmetting opgedroogd is.
- Ontsmet het inspuitpunt van het infuuszakje Glucose 5% 500 ml wrijvend gedurende 15 seconden voordat je medicatie gaat optrekken of inspuiten in het infuuszakje. Wacht vervolgens tot de ontsmetting opgedroogd is.
- Toevoegen van de medicatie aan het infuuszakje:
 - **Bereken het benodigde volume Abelcet®** dat moet toegevoegd worden aan de infuuszak. De concentratie in een Abelcet® flacon bedraagt 5 mg/ml.
 - Onttrek eerst een volume glucose 5% gelijk aan dat van Abelcet® uit de infuuszak alvorens Abelcet® erin te spuiten. **Het totale infusievolume moet 500 ml bedragen.** Gebruik GEEN zoutoplossing als infuus, enkel glucose 5% als infuusvloeistof!
 - Trek het benodigde volume Abelcet® vervolgens op en voeg het toe aan het infuuszakje van Glucose 5% 500 ml met de meegeleverde micronfilter (met behulp van spuit en naald of met een transfernaald). De flacon moet volledig leeg zijn.
 - Het totale eindvolume van de infuuszak is 500 ml.



TOEDIENING

Respecteer het tijdstip van toediening en tracht iedere dag de toediening te realiseren op hetzelfde tijdstip.

- Voordat je medicatie toedient controleer of de katheter nog goed geplaatst is door lokale observatie en reflux-controle.
- Sluit de rolklem van de infuusleiding.
- Verwijder de beschermhuls van de spike van de infuusleiding.
- Steek de spike van de infuusleiding in de insteekplaats van het infuuszakje.
- Hang het infuuszakje aan de infuusstaander.
- Knijp de druppelkamer halfvol en purgeer de infuusleiding.
- Sluit de rolklem van de infuusleiding.

- Doe zo nodig niet-steriele handschoenen aan (ter bescherming van jezelf).
- Ontsmet de naadloze connector gedurende 15 seconden. Wacht vervolgens tot de ontsmetting opgedroogd is.
- Spoel de katheter met 10 ml glucose 5%.**
 - Ontlucht de spuit met glucose 5%
 - Plaats de spuit met glucose 5% (zonder naald) op de katheterleiding
 - Spuit 10 ml glucose 5% **pulserend** in: 2ml inspuiten, stop; terug 2ml inspuiten, stop; enz.; spuit de laatste 2 ml glucose 5% traag in
 - Sluit de klem van de katheterleiding af onder positieve druk (= terwijl u de laatste milliliters glucose 5% inspuit). Verwijder vervolgens de spuit terwijl druk op de stamper blijft behouden.
- Verwijder het beschermdopje van het aansluitpunt van de infuusleiding.
- Sluit de infuusleiding aan op de hiervoor voorziene intraveneuze toedieningsweg: houd hierbij een steriel kompres gedrenkt met ontsmettingsmiddel onder de connectie tussen de infuusleiding en de katheterleiding.
- Open de rolklem van de infuusleiding en de klem op de katheterleiding en **dien de medicatie toe over 2 uur**. Zorg dat het infuuszakje volledig wordt toegediend.

- Gezien er een belangrijk volume van de **Abelcet® oplossing** achterblijft in de infuusleiding, wordt er **aanbevolen de infuusleiding na te spoelen** met glucose 5%:
 - Neem een nieuw infuus glucose 5% 50 ml
 - Sluit de rolklem op de infuusleiding. Verplaats de infuusleiding van het lege infuuszakje naar het nieuwe infuuszakje glucose 5% 50 ml.
 - Open de rolklem en doorspoel de infuusleiding met de glucose oplossing zodat de volledige leiding wordt gespoeld.

- Sluit de rolklem van de infuusleiding als de medicatie volledig is ingelopen.
- Ontkoppel de infuusleiding en de katheterleiding van elkaar: houd hierbij een steriel kompres gedrenkt met ontsmettingsmiddel onder de connectie tussen de infuusleiding en de katheterleiding.
- Spoel de katheter met 10 ml glucose 5%.**

- Ontlucht de spuit met glucose 5%
 - Plaats de spuit met glucose 5% (zonder naald) op de katheterleiding
 - Spuit 10 ml glucose 5% **pulserend** in: 2ml inspuiten, stop; terug 2ml inspuiten, stop; enz.; spuit de laatste 2 ml glucose 5% traag in
 - Sluit de klem van de katheterleiding af onder positieve druk (= terwijl u de laatste milliliters glucose 5% inspuit). Verwijder vervolgens de spuit terwijl druk op de stamper blijft behouden.
- Ontsmet de naaldloze connector gedurende 15 seconden.

BEWARING & AFVALVERWERKING

De flacon moet bewaard worden in de koelkast (2-8°C).

Het opgeloste product is voor eenmalig gebruik en elke ongebruikte oplossing moet worden vernietigd.

Lege glazen flacons van geneesmiddelen zijn recycleerbaar en mogen dus met de selectieve glaszameling worden meegegeven. De inzameling en verwerking van injectienaalden gebeurt via een naaldcontainer welke (doorgaans via de thuisverpleegkundige) verwijderd wordt via het klein gevaarlijk afval. Als de naald van de spuit kan worden gescheiden, mag u de lege spuit wel met het gewone huisvuil meegeven, samen met lege infusen en infuusleidingen.

AANDACHTSPUNTEN

- De flacon bevat een suspensie. De flacon moet daarom goed geschud worden voor gebruik totdat de bodem vrij is van geel depot.
- Gebruik GEEN zoutoplossing als infuus- of spoelvoestof, enkel glucose 5%.
- De belangrijkste nevenwerkingen zijn: nefrotoxiciteit, hypokaliëmie en rillingen.
- Bij vermoeden van bijwerkingen op de medicatie of roodheid rond de insteekplaats, contacteer de arts.
- Voor meer informatie raadpleeg de bijsluiter op <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

BRONNEN

SKP Abelcet® (09/2019)