

CHECKLIST RICHTLIJNEN MFC

Farmacotherapeutische richtlijnen

Anticoagulantia (monitoring, interacties, peri-operatief)
Stress ulcus profylaxie
Pijnbehandeling / conversie opioïden / doorbraakpijn
Gebruik van slaapmiddelen
Behandeling van obstipatie / voorbereiden coloscopie
Gebruik van antidoten
Wondzorg
Profylactisch, empirisch en therapeutisch gebruik van antibiotica
Langdurige linezolid therapie
Monitoring van geneesmiddelenconcentratiespiegels (anti-epileptica, antibiotica, warfarine, ...) + dosisaanpassingen (vancomycine, warfarine,...)
Gebruik van enterale en parenterale voeding
Dosis-aanpassing op basis van nier -en leverfunctie
Waakinfuus (wanneer, welke toevoegingen) (zie bijlage 3)
IV/PO switch (wanneer, bij welke geneesmiddelen)
Pre- en post operatief geneesmiddelen gebruik
Opvolgen en bijsturen van electrolietstoornissen
Geneesmiddelen met QT verlenging
Conversie laag molecuulair gewicht heparines
Conversie systemische corticosteroiden / afbouwschema corticosteroiden / stressdosis corticosteroiden tijdens operatieve ingreep
Richtlijnen diabetes (insuline/orale antidiabetica) tijdens onderzoeken, lokale anesthesie
Borstvoeding en zwangerschap
Post operatief/post chemotherapie braken
Agitatie/delirium
COPD/ Global Initiative for Asthma (GINA) (astma)
Epilepsie aanval (stuipen)
Anti-emetica
Albuminen
Plasmaexpanders
Tocolytica

Farmacotechnische richtlijnen

Pletten van medicatie (cfr www.vza.be)
Tijdstip inname geneesmiddelen in relatie tot voeding
Toedienen van geneesmiddelen via een maagsonde (cfr www.vza.be)
Richtlijnen bij latexallergie
Toedienen van intraveneuze geneesmiddelen (oplosmiddel, looptijd, onverenigbaarheden, stabiliteit)