

Checklist langdurige linezolid- behandeling
--

Dosis: 2x/dag 600 mg

Ziekenhuisgebruik: zonder aanvraag van terugbetaling bij initiatie van linezolid i.v./p.o.voor bewezen MRSA/MRSE/ARE infectie ingeval van:

- Glycopeptide intermediaire- of resistente pathogene kiem
- Glycopeptide-intolerante patiënt
- Het niet meer in stand houden van parenteraal toegediende glycopeptidebehandeling om medisch reden (hier enkel mogelijkheid om linezolid p.o. toe te dienen)

Ambulant gebruik (na hospitalisatie):

- Linezolid in het ziekenhuis gekregen, verderzetten van de behandeling met oraal Linezolid na ontslag.
- Glycopeptide in het ziekenhuis gekregen, verderzetten van de behandeling met oraal Linezolid na ontslag.
- Ambulant gebruik maximum voor 20 dagen, verlengbaar met periodes van 20 dagen

Bij ontslag: begeleidende brief over Linezolidgebruik voor de huisarts.

Langdurig gebruik van oraal Linezolid:

- Toedienen van Befact (forte):- vit. B1 (100 mg/d) en B6 (50 mg/d) en B12 (neuroprotectie en voorkomen/vertragen van hematol. afwijkingen en lactaatacidose)
- Controle van de patiënt: wekelijkse bloedafname
 - o PBO : anaemie en trombocytopenie (mogelijk vanaf 3^o behandelingsweek)
 - o Bicarbonaat (=CO₂) : lactaatacidose (zeldzaam, cfr daling van bicarbonaat)
- Controle van de patiënt (spontane melding/bevragen bij check up)
 - o Symptomen van visusstoornissen (verandering gezichtscherpte/- kleurenzien) ifv optische neuropathie.
 - o Neuropatische klachten in de onderste ledematen (tintelingen) ifv perifere neuropathie.
 - o Misselijkheid/ademhalingsproblemen ifv lactaatacidose.
- Controle van de patiënt

Maandelijks oogonderzoek bij een oftalmoloog