

**INDIEN VOLDAAN IS AAN ONDERSTAANDE CRITERIA,
OVERWEEG DAN OMZETTING NAAR ORALE THERAPIE:**

Klinische status patiënt

- Geen indicatie die absoluut IV therapie vereist (zoals meningitis, endocarditis, infecties bij neutropenie, ongedraineerde abscessen, empyemen, osteomyelitis, infecties van geïmplan-teerd materiaal,...);
- Significante daling van inflammatieparameters: temperatuur ($<38^{\circ}\text{C}$), leukocytose, CRP;
- Geen onverklaarbare tachycardie (hartritme < 100).

Orale absorptie

- Patiënt tolereert orale vloeistoffen;
- Afwezigheid van medische problemen die orale absorptie reduceren (diarree, braken, gastro-intestinale chirurgie);
- Geen chirurgische ingreep binnen drie dagen gepland.

Antimicrobieel middel

- Een geschikte orale vorm is beschikbaar.

art. 9197

OVERZICHT VAN IV ANTIMICROBIËLE MIDDELEN MET HUN EVENTUELE ORALE VERVOLGTHERAPIE	
Intraveneus	Oraal
Floxapen® 1 g q4-6u	Floxapen® 500 mg q6u
Pentrexyl® 1 g q4-6u	Clamoxyl® 500 mg - 1 g q6-12u
Augmentin® 1 g q6-8u	Augmentin® 500 - 875 mg q6-12u Augmentin® retard 2 x 1 g q12u
Tazocin®* 2 - 4 g q6-8u	Op antibiogram bv. Tavanic® ± Flagyl®,...
Ceftriaxone® 1 - 2 g q24u	Op antibiogram bv. Tavanic®, Augmentin®,...
Dalacin® C 300 - 600 mg q8u	Dalacin® C 300 - 600 mg q8u
Tavanic® 500 mg q12-24u	Tavanic® 500 mg q12-24u
Avelox® 400 mg q24u	Avelox® 400 mg q24u
Diflucan® 200 mg q12-24u	Diflucan® 200 mg q24u
Flagyl® 500 mg q8u	Flagyl® 500 mg q8u
* reserve antibioticum = motivatievoorschrift vereist Gebruikelijke dosering voor volwassenen	
Wanneer het antibiogram gekend is, moet de empirische therapie versmald worden!	

OVERZICHT VAN RELEVANTE INTERACTIES VAN ORALE ANTIMICROBIËLE MIDDELEN						
Merkmaken	Actief bestanddeel	Voedsel ¹	Kationen ²	Antacida ³	Dosis Δ bij ↓ nierfunctie ⁴	Maatregelen
Floxapen®	Flucloxacilline	-	+	+	neen	¹ inname 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd
Clamoxyl®	Amoxicilline	+	+	+	ja	
Augmentin® incl. retard	Amoxicilline + clavulaanzuur	+	+	+	ja	
Dalacin® C	Clindamycine	+	+	+	neen	² 10' - 30' rechtop blijven en capsules innemen met een groot glas water om slokdarmirritatie te voorkomen
Tavanic®	Levofloxacin	+	-	-	ja	^{2,3} Tavanic® tenminste 2 uur vooraf of 4 uur nadien innemen; enkel gelijktijdige inname van calcium is toegestaan.
Avelox®	Moxifloxacin	+	-	-	ja	^{2,3} Avelox® tenminste 2 uur vooraf of 4 uur nadien innemen; enkel gelijktijdige inname van calcium is toegestaan.
Flagyl®	Metronidazol	+	+	+	neen	¹ Inname tijdens de maaltijd wordt het best verdragen; vermijd gelijktijdige inname van alcohol.
Diflucan®	Fluconazol	+	+	+	ja	

+ = mag **wel** gecombineerd worden - = mag **niet** gecombineerd worden

¹ Voedsel: alle producten, behalve Floxapen®, kunnen bij gastro-intestinale last tijdens of na de maaltijd gegeven worden.

² Kationen: ijzer (Loferron® bruistabletten, Fer-In-sol druppels, Fero-gradumet® tabletten, Gestiferol® tabletten, Bioijzer® junior siroop), calcium (Sandoz Calcium® bruistabletten of zakjes, Calciumcarbonaat capsules, Cacit® vit D₃ zakjes, Steovit® D₃ kauwtabletten), magnesium (Magnesmas-myl® tabletten, Magnetop® zakjes), zink (Redoxon® + Zink bruistabletten, Zinksulfaat capsules)

³ Antacida (zuurremmende middelen): Riopan® zakjes, Gaviscon®

⁴ Dosis Δ bij ↓ nierfunctie: ja = dosisaanpassing vereist bij nierfunctievermindering. neen = geen dosisaanpassing vereist bij nierfunctievermindering
Alle producten, behalve Augmentin® retard, kunnen indien nodig geplet worden. Als alternatief kan Augmentin® siroop/zakjes aangewend worden

Vragen? Contacteer dr. Yvan Valcke (2346), apr. Mark Dejongh (2799) of apr. Chantal Blancquaert (7527)